

この部分を
引き上げてください。

第2類医薬品

日本薬局方 フェルビナクテープ
販売名 **ロイヒフェルビ温**

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

16
枚

特長

- ロイヒフェルビ温™は、非ステロイド系の鎮痛消炎成分フェルビナクを1枚あたり35mg配合したテープ剤です。
- フェルビナクは痛みの関連物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉のつらい痛みにすぐれた効果をあらわします。
- こちよい温感タイプです。

- 無臭タイプで、人前でも臭いが気になりません。
- 貼りやすいウイングセパレーター™を採用しています。セパレーターの中央を開くと翼のように広がり、セパレーターを左右にはがす際の取っ手になります。ひとりでも貼りやすい形状です。
- 基布が伸縮性にすぐれているので、肌によくフィットします。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、キズぐち。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、水疱等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状の改善が見られない場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

入浴する場合は、貼った場所がヒリヒリする場合がありますので、必ず30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分以上経過してからご使用ください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のセパレーター(フィルム)をはがし、1日2回を限度として患部にお貼りください。

■用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいた後や皮ふがぬれている場合は、よく拭き取ってからお貼りください。
- (4) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側に1cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が発現しないことを確かめてから使用してください。
- (5) 皮ふの弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。
- (6) 発熱するもの(コタツ、ホットカーペット、カイロ、電気毛布等)と併用しますと、刺激が強くなる場合がありますので、ご注意ください。

成分・分量

成分・分量(膏体100g中:ただし膏体質量は1g/1枚)
フェルビナク・・・3.5g

添加物として、流動パラフィン、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、テルペン樹脂、ジブチルヒドロキソトルエン、香料(ノニル酸ワニリルアミド)を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため未使用分は元の袋に入れて、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

包装 7cm×10cm・・・16枚



本品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店、又は下記にお願いいたします。

ニチバン株式会社 お客様相談室 TEL 0120-377218
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先:

(独)医薬品医療機器総合機構 TEL 0120-149-931

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

NB16M04

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

<http://www.nichiban.co.jp/>

日本製 MADE IN JAPAN TMIは商標です。